

Continuez de suivre les règles sanitaires!

Lorsque vous êtes vacciné, la probabilité d'attraper le Covid 19 diminue mais est toujours présente. Le risque de forme grave et d'hospitalisation est fortement diminué.

- Continuez de porter un masque buccal en cas de foule et où cela est obligatoire: à la pharmacie, à l'hôpital, chez votre médecin,...
- Lavez et désinfectez vos mains régulièrement
- Gardez vos distances.
- Favorisez les activités extérieures.
- Prenez soin des personnes à risque telles que les femmes enceintes, enfants en bas âge, malades chroniques, personnes âgées,...



Vous venez de recevoir votre vaccin contre le Covid-19?

Restez encore 15 minutes assis afin que nous puissions vous assister si besoin après la vaccination.



”
Merci de vous faire vacciner! De cette manière, vous vous protégez, et contribuez à protéger vos proches et toute la communauté!
“

La vaccination au Covid-19 chez votre pharmacien de référence!





COMBIEN DE DOSES DE VACCINS DOIS-JE RECEVOIR?

- La vaccination vous protège efficacement contre le Covid-19, surtout contre la forme sévère qui entraîne une hospitalisation. En cas d'infection, vous transmettez également le virus moins longtemps lorsque vous avez été vacciné.
- Grâce à la vaccination, votre corps fabrique des anticorps qui vous protègent contre la maladie au contact du virus.
- Après un certain temps, la quantité d'anticorps diminue ce qui réduit votre protection. Un vaccin de rappel est alors nécessaire. Pour le Covid-19, une dose de rappel est prévue après 6 mois.
- Les personnes souffrant de troubles immunitaires peuvent avoir besoin d'une dose supplémentaire.

EFFETS SECONDAIRES?



Y a-t-il des effets secondaires?

- Comme pour tout médicament ou vaccin, des effets secondaires sont possibles. Ceux-ci sont légers et disparaissent d'eux-mêmes après quelques jours.
- Vous pouvez prendre un anti-douleur tel que du paracétamol. Discutez-en avec votre pharmacien.



Quels effets secondaires peuvent survenir?

- Vous pouvez ressentir une certaine douleur, une rougeur ou un gonflement au niveau du point de ponction, des ganglions du cou ou de l'aisselle. Des maux de tête, des douleurs musculaires, de la fatigue, des nausées, de la fièvre et des douleurs articulaires peuvent également apparaître temporairement.



Le risque de réaction allergique est minime

- Si vous présentez une réaction telle qu'une éruption rouge ou des démangeaisons sur tout le corps, contactez immédiatement votre médecin.
- Si vous continuez à avoir d'autres symptômes, contactez votre médecin.

SAVIEZ-VOUS QUE...

- Les vaccins contre le Covid 19 - comme tout médicament - sont passés par tout le processus de recherche et d'évaluation (efficacité/sécurité) avec une priorité absolue, ce qui les a rendus disponibles plus rapidement.
- Certains effets secondaires passent (presque) inaperçus dans les études parce qu'ils sont exceptionnellement rares.
- Vous pouvez également contribuer à la sécurité du vaccin en signalant les effets secondaires connus ou inconnus. En enregistrant l'effet secondaire via l'adresse: https://www.afmps.be/fr/notification_effets ou par l'intermédiaire de votre médecin traitant ou de votre pharmacien.
- La vaccination n'a aucune influence sur la fertilité mais, comme en cas de stress ou de maladie, la vaccination peut perturber brièvement le cycle menstruel.
- Si vous voulez lire la notice complète, vous pouvez toujours la demander à votre pharmacien.

