

## Schéma vaccinal

### Patient de > 12 ans

	1 <sup>ère</sup> dose	Délai minimum 2 <sup>ème</sup> dose	Délai minimum booster RNA <sup>1</sup>
Cominarty®		21 jours	4 mois
Spikevax®		28 jours	4 mois
Vaxzevria®		51 jours	4 mois
Vaccin COVID-19 Janssen®		X	2 mois

*schéma de base*

### Patient immunodéprimé (> 5 ans)

	1 <sup>ère</sup> dose	Délai minimum 2 <sup>ème</sup> dose	Délai minimum dose supplémentaire RNA <sup>2</sup>	Délai minimum booster RNA <sup>1</sup>
Cominarty®		21 jours	1-3 mois	3 mois
Spikevax®		28 jours	1-3 mois	3 mois
Vaxzevria®		51 jours	1-3 mois	3 mois
Vaccin COVID-19 Janssen®		X	1-3 mois	3 mois

Les > 80 ans sur avis médical pour un booster ultérieur.

Les 12-30 ans : toujours Pfizer (les moins de 12 ans sont réorientés vers les centres de vaccination). Les 12-15 ans : autorisation parentale pour la 1<sup>ère</sup> dose.

<sup>1</sup>La dose de rappel booster se fait avec un RNA : Pfizer dose complète ou Spikevax en demi-dose.

OPHACO

AUP+  
ASSOCIATION DES UNIONS DE PHARMACIENS



AVIQ

17/05/2022

<sup>2</sup>La dose supplémentaire des immunodéprimés se fait avec un RNA à dose complète.

OPHACO

**AUP**   
ASSOCIATION DES UNIONS DE PHARMACIENS



**AVIQ**